Tchernobyl : retombées sur nos cours de chimie

par B. PROUST,

Lycée Louis-le-Grand, Paris.

Nous examinons ici quelques aspects purement chimiques des récents événements survenus à la centrale nucléaire de Tchernobyl, assez simples cependant pour être présentés aux élèves du secondaire.

I. ORIGINE DE L'ACCIDENT : UNE ERREUR ELECTROCHIMIQUE ?

Il n'est pas nécessaire de rappeler ici le film des événements du mois de mai 1986, ceux-ci furent abondamment diffusés et commentés par la presse; bornons-nous à rappeler quelques faits saillants. Le 25 avril, une explosion dans le hall des machines (commun aux tranches 3 et 4 de la centrale) endommageait le circuit de refroidissement du réacteur 4, entraînant la fusion complète et très rapide du cœur.

Dès le 2 mai, lors d'une conférence de presse E.d.F., le directeur de l'I.P.S.N. (*) proposait un premier scénario suivant lequel la rupture d'étanchéité de la dalle était due à des « feux d'hydrogène » produit d'une réaction eau-zirconium.

En effet, en fonctionnement normal, le cœur d'une centrale de type RBM-K 1000 (voir schéma et principales caractéristiques fig. p. 1513) est refroidi par de l'eau circulant dans des tubes de force formés d'un alliage niobium-zirconium. Le zirconium a été choisi pour sa faible section efficace de capture des neutrons; or c'est un métal très réducteur : $E^0(\text{Zr}^{4+}/\text{Zr}_2) = -1,53 \text{ V}$.

Comme l'aluminium, il est facilement passivé par formation d'une couche de zircone qui le protège (températures de fusion : $\text{Zr} : 1\,860^\circ\text{C}$; $\text{ZrO}_2 : 2\,700^\circ\text{C}$). Il est peu réactif à température ordinaire et résiste bien à la corrosion.

Par suite de l'échauffement du combustible nucléaire, l'eau contenue dans les tubes s'est vaporisée et la température s'est

(*) Institut de Protection et de Sécurité Nucléaire.

radio-élément	$^{90}_{38}\text{Sr}$	$^{137}_{55}\text{Cs}$	$^{131}_{53}\text{I}$
période	28 ans	30 ans	8,04 jours
énergie β max en Mev	0,54 (100)	1,17 (8) 0,51 (92)	0,815 (0,7) 0,608 (87,2) 0,335 (9,3) 0,250 (2,8)
énergie γ en Mev		0,662 (84)	0,722 (3) 0,637 (9) 0,364 (80) 0,284 (5) 0,08 (2)

Tableau. — Principaux radio-éléments toxiques [3] (pour les schémas de désintégration, on pourra se reporter aux articles [1] et [4]).

élevée, assez pour permettre la réduction de l'eau par le zirconium :

L'hydrogène ainsi formé est à l'origine d'une seconde explosion (après celle du hall des machines) qui détruit l'unique enceinte du réacteur. Celui-ci étant à ciel ouvert, les produits de fission les plus volatils furent, dès le 26 avril, rejetés dans l'atmosphère et soumis aux caprices des vents. On notera que, en 1979, à la centrale de Three Miles Island (U.S.A.), la même réaction d'oxydo-réduction n'eut pas les mêmes effets car l'enceinte de confinement avait résisté.

D'autres scénarios furent proposés par la suite, leur diversité parfois plus liée à des contingences médiatiques que scientifiques. On peut cependant penser que l'eau issue des conduites éclatées a ensuite réagi avec le graphite modérateur :

II. LES RETOMBÉES RADIOACTIVES : COMMENT SONT-ELLES ASSIMILÉES ?

Le cœur du réacteur contient une centaine de produits de fission, stables ou radioactifs parmi lesquels dominent ceux dont

Fig. — Réacteur RBM-K (Reaktor Bolchoï Mochtechnostni Kipiachtchii, ce que l'on peut traduire par : « Grand et très puissant réacteur bouillant ») :

combustible	UO ₂ enrichi de 1 à 2 % selon les zones
modérateur	graphite
refroidissement	eau bouillante
puissance électrique	1 000 MW
température vapeur	284 °C
pression vapeur	70 bars.

Un seul circuit d'eau rendue radioactive (tritium) en passant dans le cœur — pas de confinement secondaire — réacteurs construits par tranches de deux avec salle de machine commune où se trouvent 4 turbo-alternateurs de 500 MW.

Cette filière soviétique est à comparer à la filière BWR (Boiling Water Reactor) promue par la Compagnie Générale Electric aux U.S.A. [1].

le nombre de masse est voisin de 90 et 140 [1]. Les plus volatils s'échappent sous forme de gaz :

ainsi I₂ (T.E. = 183 °C), Cs (T.E. = 670 °C) ;

les autres sous forme d'aérosols : Sr (T.E. = 1 366 °C).

^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{131}I sont parmi les plus abondants et les plus toxiques car leurs périodes sont comprises entre quelques jours et quelques années et ils sont facilement métabolisés. Inhalés ou bien ingérés, ils suivront la même voie que les éléments stables de la même famille puisqu'ils ont sensiblement les mêmes propriétés chimiques. Leur métabolisme est complexe et souvent mal connu ; le chimiste peut cependant en comprendre certains aspects.

Le strontium 90.

Ses propriétés sont voisines de celles du calcium. Ca^{2+} est un ion extracellulaire présent principalement dans le tissu osseux sous forme d'hydroxyapatite : $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$.

Le césium 137.

Ses propriétés sont voisines de celles du sodium et du potassium. Na^+ est un ion extracellulaire jouant un rôle important dans la régulation des équilibres acido-basiques. K^+ est un ion intracellulaire ayant un rôle physiologique très actif en particulier dans la contraction musculaire et dans le passage de l'influx nerveux.

L'iode 131.

Il est assimilé sous forme d'iodure par la glande thyroïde et se fixe sur la tyrosine en présence de peroxyde d'hydrogène :

Cette réaction est catalysée par la thyroïde peroxydase. On voit que l'iode s'est substitué à l'hydrogène du cycle benzénique, c'est un exemple de substitution électrophile en milieu biologique [2]. On remarque l'effet ortho-orienteur du groupe hydroxyle, I^+ est un intermédiaire vraisemblable mais son mode de formation n'est pas connu. Les hormones thyroïdiennes sont ensuite synthétisées lors d'une suite de substitutions et de condensations :

thérapie, en particulier l'iode 131 pour le traitement des cancers de la thyroïde [5]. Les cellules souches de la moelle osseuse, plus fragiles, sont détruites d'où la nécessité d'une greffe de la moelle.

Mutation.

Les ions carbonium sont des agents cancérigènes, l'A.D.N. étant leur cible principale [6]; un brin atteint peut devenir inapte à la division ou bien provoquer des mutations irréversibles pouvant engendrer des cancers. Faute d'études statistiques poussées, on ignore encore l'effet de ce « brouillage » du code génétique sur la descendance. Ces mutations peuvent être engendrées par de faibles doses, inférieures à la dose maximale admissible (DMA) ([1] p. 213); dans ces conditions, peut-on vraiment parler de seuil de toxicité nucléaire ?

En prolongation à cette modeste mise au point, j'inviterai le lecteur à se reporter aux articles cités, il constatera que sa collection de « B.U.P. » contient bien des richesses.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] C. RUHLA. — *L'énergie nucléaire*. B.U.P. n° 569 (nov. 1974).
 - [2] J.-C. CHOTTARD, J.-C. DEPEZAY, J.-P. LEROUX. — *Chimie fondamentale* t. III, Hermann (1982).
 - [3] DOCUMENTA GEIGY. — *Tables scientifiques*, remarquablement complètes, elles ne sont plus éditées mais votre médecin voudra peut-être bien vous céder la sienne...
 - [4] H. GIÉ et H. LE BAIL. — *Etude des désintégrations radioactives*, B.U.P. n° 627 (oct. 1980).
 - [5] J. PIERREZ. — *Utilisation des radio-isotopes en médecine nucléaire*, B.U.P. n° 615 (juin 1979).
 - [6] G. LÉVY, J.-F. LABARRE. — *La chimie de coordination et le problème du cancer*, B.U.P. n° 654 (mai 1983).
-